



MAXFORCE QUANTUM

NR POZWOLENIA NA OBRÓT PRODUKTEM BIOBÓJCZYM 4279/10 z dnia 29-11-2010

SUBSTANCJA CZYNNNA **IMIDACHLOPRYD - 0,3mg/g (0,03%)**
1-(6-chloropirydyn-3-ylometylo)-N-nitroimidazolidyn-2-ylidenoamina

POSTAĆ PRODUKTU ŻEL (RB-gotowy do użycia) ZWALCZAJĄCY MRÓWKI.
DO STOSOWANIA PRZEZ PROFESJONALNE EKIPY DDD.

MAXFORCE QUANTUM ma postać żelu gotowego do użycia na bazie imidakloprydu (insektycyd z grupy związków chloronikotynili) i jest bardzo skuteczną przynętą dla najważniejszych gatunków mrówek europejskich. Dzięki długo utrzymującej się skuteczności po zastosowaniu, łączy w sobie wszystkie istotne cechy dobrej przynęty:

- wysoki stopień zwabiania;
- wysoki stopień wprowadzania preparatu do kolonii mrówek.

Skład preparatu MAXFORCE QUANTUM został dobrany w taki sposób, by jego pierwszoplanowym celem było zwalczanie kolonii mrówek. Pożądane jest aby likwidowanie kolonii następowało z opóźnieniem, dzięki czemu osiągnięte zostanie całkowite rozwiązanie problemu. W przypadku właściwego zastosowania, w większości przypadków należy liczyć się ze znacznym i widocznym spadkiem liczby mrówek w ciągu tygodnia od momentu rozpoczęcia stosowania preparatu. Kolonia zostaje zniszczona z reguły po 2-3 tygodniach.

MAXFORCE QUANTUM wykazuje bardzo dobre działanie owadobójcze w stosunku do mrówek faraona (*Monomorium faraoensis* L.)

Preparat nie zanieczyszcza powietrza w pomieszczeniu.

ZASTOSOWANIE

ZWALCZANIE MRÓWEK

MAXFORCE QUANTUM został opracowany specjalnie do zwalczania mrówek faraona (*Monomorium pharaonis*), koczowniczej czarnogłowej (*Tapinoma melanocephalum*) i hurtnicy pospolitej (*Laskus Niger*), jest jednak skuteczny także przeciwko innym, nie wymienionym tu gatunkom mrówek.

- Preparat zalecany jest do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych jak i na zewnątrz budynków.
- Szczególnie polecany do pomieszczeń tzw. specjalnych, w których ograniczona jest możliwość stosowania preparatów w postaci aerozoli, np. w pomieszczeniach szpitalnych lub zakładach produkcji i przetwórstwa żywności.

ZWROTY OKREŚLAJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA

H412
EUH401

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

ZWROTY OKREŚLAJĄCE WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA

P501

Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

INNE ZAGROŻENIA

Inne zagrożenia nie są znane.

SPOSÓB STOSOWANIA I DAWKOWANIE

- Nie rozprawdzać żelu na powierzchniach gorących, zakurzonych lub zabrudzonych.
- Nie stosować na powierzchniach delikatnych (obicia, wykładziny, itp.) – istnieje możliwość poplamienia.
- Preparat MAXFORCE QUANTUM należy rozprawdzać za pomocą właściwego dozownika.
- Przed zastosowaniem należy ocenić stopień rozprzestrzenienia się owadów i wykryć miejsca lęgowe, po czym rozprawdzić preparat w bezpośredniej bliskości tras przemarszu mrówek.
- Przynętę należy rozprawdzać na poziomych, nieabsorbujących powierzchniach, w miejscach niedostępnych dla ludzi i zwierząt.
- W miejscach rozprawdzania MAXFORCE QUANTUM nie stosować innych metod zwalczania mrówek (np. preparatów w aerozolu).

STOSOWANIE WEWNĄTRZ BUDYNKU

ZWALCZANIE MRÓWEK FARAONA I KOCZOWNICZKI CZARNEJ EJ
Porcję preparatu umieścić tylko w obszarze największej aktywności mrówek. Obszar stosowania obejmuje zwykle kuchnię, WC i łazienkę. Na 1m² powierzchni należy użyć 1 porcję żelu (0,2g).

ZWALCZANIE HURTNICY POSPOLITEJ

Przynętę rozprawdzać tylko w miejscach największej aktywności mrówek. Szczególnie w miejscach wejścia mrówek do budynku. Na jeden metr bieżący trasy przemarszu mrówek należy stosować jedną porcję preparatu (0,2g) – maksymalnie 2g.

STOSOWANIE NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU

ZWALCZANIE HURTNICY POSPOLITEJ

Stosować bezpośrednio w miejscach zagnieżdżenia. Na jedno gniazdo stosować 2g żelu. W przypadku większej ilości wejść do gniazda powyższą ilość preparatu (2g) rozdzielić na wszystkie wejścia. W wyjątkowych sytuacjach gdy liczba mrówek jest bardzo duża i jedna porcja preparatu nie wystarczyła do zniszczenia kolonii, żel należy nanieść ponownie w tych samych miejscach.

1 porcja przynęty o średnicy 1 cm waży 0,2g.

W CELU UNIKNIĘCIA WYSTĄPIENIA RYZYKA DLA CZŁOWIEKA I ŚRODOWISKA NALEŻY PRZESTRZEGAĆ SPOSOBU STOSOWANIA I DAWKOWANIA.

UWAGA – MAXFORCE QUANTUM NIE MOŻE DOSTAĆ SIĘ DO GNIAZDEK ELEKTRYCZNYCH – ISTNIEJE RYZYKO WYSTĄPIENIA KROTKIEGO SPIĘCIA I PORAŻENIA PRĄDEM.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie stosować żelu na powierzchniach, na których są przechowywane, przygotowywane lub spożywane produkty spożywcze.
- W trakcie stosowania żelu, żywność i naczynia kuchenne powinny być chronione przed zanieczyszczeniem.
- Żel wyklądać wyłącznie w miejscach niedostępnych dla dzieci i zwierząt.
- Nie stosować żelu w miejscach, gdzie regularne czyszczenie może spowodować przemieszczenie trutki na powierzchnie stykające się z produktami żywymi.
- Żel nie powinien być wykładany na powierzchniach regularnie czyszczonych przy użyciu wody, ponieważ mycie powierzchni może spowodować jego usunięcie.
- Nie stosować żelu w miejscach, na których niedawno rozpylono środek owadobójczy.
- Nie rozpylać środka owadobójczego na wyłożony żel.
- Podczas pracy z preparatem stosować rękawice ochronne.
- W przypadku zanieczyszczenia preparatem skóry lub oczu miejsca te przemyć kilkakrotnie wodą.
- Podczas przeprowadzania zabiegu nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu.
- Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i karmą dla zwierząt.
- Preparat przechowywać w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych a zwłaszcza dzieci.

- Po użyciu MAXFORCE QUANTUM, a przed posiłkiem, należy dokładnie umyć ręce i skórę wodą z mydłem.
- Produkt szkodliwy jest dla ryb i organizmów wodnych. Nie zanieczyszczać produktem lub jego wkładami karmy dla ryb, stawów, cieków i ujęć wodnych, rowów, itp.

OBJAWY ZATRUCIA

Jeśli doszło do połknięcia dużych ilości, mogą wystąpić następujące objawy:

- Zawroty głowy
- Ból brzucha
- Mdłości

Objawy i zagrożenia odnoszą się do skutków obserwowanych po przyjęciu znaczących ilości substancji aktywnej (-ych).

Z powodu małego stężenia składnika aktywnego w tej formulacji spożycie ilości zagrażających zdrowiu jest mało prawdopodobne

PIERWSZA POMOC

Postać produktu, gdy jest zawarty w opakowaniu handlowym praktycznie uniemożliwia rozlanie się. Jednakże, jeżeli znaczne ilości zostaną rozlane należy stosować się do następujących porad. Usunąć z zagrożonej strefy. Ułożyć i transportować ofiarę w stabilnej pozycji (leżącej na boku). Natychmiast zdjąć zanieczyszczone ubranie.

W PRZYPADKU KONTAKTU PRZEZ SKÓRĘ - Dokładnie zmyć dużą ilością wody i mydła, jeżeli jest możliwe z polietylenoglykolem 400, a następnie spłukać wodą. Uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się i utrzymywania podrażnienia.

W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI - Natychmiast płukać dużą ilością wody, także pod powiekami przynajmniej przez 15 minut. Usunąć soczewki kontaktowe, jeżeli są obecne, po pierwszych 5 minutach, potem kontynuować płukanie oczu. Uzyskać pomoc medyczną w przypadku pojawienia się i utrzymywania podrażnienia.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA - Natychmiast wezwać lekarza lub powiadomić centrum zatruc. Wypluć usta. Wywołać wymioty tylko jeśli: 1. poszkodowany jest całkowicie przytomny, 2. brak dostępu do pomocy medycznej, 3. w przypadku połknięcia znaczących ilości (więcej niż jeden łyk) oraz 4. jeśli od połknięcia upłynęła nie więcej niż 1 godzina. (Uważać aby zwrócona treść pokarmowa nie przedostała się do dróg oddechowych)

ANTIDOTUM

BRAK - STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

- Wymagane monitorowanie funkcji oddechowych i krążenia.
- Płukanie żołądka.
- Podać węgiel (węgiel leczniczy) oraz siarczan sodu.
- W sytuacjach, kiedy konieczna jest inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

OŚRODKI TOKSYKOLOGICZNE W POLSCE

Gdańsk - 058 349 28 31

Kraków - 012 411 99 99

Warszawa - 022 619 66 54

Poznań - 061 847 69 46

MAGAZYNOWANIE

Preparat przechowywać w:

- oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach;
- w suchym i dobrze wentylowanym magazynie, w temperaturze od 0 do 40°C;
- w miejscach niedostępnych dla osób nieupoważnionych, zwłaszcza dzieci oraz zwierząt domowych;
- z dala od środków spożywczych, pasz, naczyń na żywność, źródeł ciepła i ognia.
- chronić przed mrozem i bezpośrednim dostępem promieni słonecznych

W tych warunkach środek MAXFORCE QUANTUM może być przechowywany przez 2 lata.

ZALECENIA DOTYCZĄCE WENTYLACJI

Preparat nie działa szkodliwie przez drogi oddechowe.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI PREPARATU I OPAKOWANIEM

WYRÓB

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyrób może być wywożony na miejsce składowania odpadów lub do spalarni, jedynie przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów.

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych
Wyrobtów Medycznych
i Produktów Biobójczych
ul. Żąbkowska 41, 03-736 Warszawa
Regon 015249601

OPAKOWANIA NIE OCZYSZCZONE Nie całkowicie opróżnione opakowanie powinno być traktowane jako odpad niebezpieczny. Produkt i jego opakowanie powinny być usuwane po zużyciu, z zachowaniem wszystkich środków ostrożności. Unikać wyrzucania bezpośrednio do środowiska. Zapoznać się z instrukcjami na karcie charakterystyki produktu.

UWAGA - ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

WAŻNE

- Należy przestrzegać zasad zastosowania, dawek, warunków i środków ostrożności opisanych na opakowaniu, określonych z uwzględnieniem charakterystyki produktu i zalecanego zastosowania.
- Producent gwarantuje odpowiednią jakość swoich produktów sprzedawanych wyłącznie w oryginalnych opakowaniach.
- Nie będzie brana odpowiedzialność za skutki wynikłe z niezgodnego instrukcją i przeznaczeniem użycia preparatu.
- Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. przed użyciem należy zapoznać się z treścią etykiety preparatu.
- Karta charakterystyki preparatu dostępna jest dla użytkowników przemysłowych na żądanie.

DATA PRODUKCJI
DATA WAŻNOŚCI
POJEMNOŚĆ
NR SERII

NA OPAKOWANIU
2 LATA OD DATY PRODUKCJI
.....
.....

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych
Wyrobnów Medycznych
i Produktów Biobójczych
ul. Żąbkowska 41, 03-736 Warszawa
Regon 015249601

z upoważnienia Prezesa
ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Rejestracji Produktów Biobójczych
E. Buchniet
Elżbieta Buchniet

2014-02-24