Instrukcja użycia

DYSPENSER FEROMONOWY SP – LOKATOR .

Dyspenser feromonowy SP – Lokator służy do wykrywania i monitorowania populacji osobników dorosłych mklika mącznego (Ephestia kuehniella) i innych gatunków mklików (Ephestia sp., Cadra sp.) oraz omacnicy spichrzanki (Plodia interpunctella). Może być stosowany w zakładach przetwórstwa spożywczego, w przechowalniach i w magazynach. Zawiera feromon płciowy samicy mklika.

Właściwości preparatu:

Dyspenser feromonowy SP – Lokator jest integralną częścią feromonowej pułapka na mkliki SP-Lokator, która wykonana jest z lakierowanej tektury uformowanej w kształcie pudełka o wymiarach podstawy 10 x 7 cm Jej podstawa wewnątrz powleczona jest nie schnącym klejem. W środku tekturowej pułapki umieszczony jest dyspenser feromonowy. Samce mklików i omacnicy spichrzanki dostają się do pułapki, wabione przez feromon płciowy, uwalniany przez dyspensor feromonowy. Zwabione motyle przyklejają się do powleczonej klejem podstawy pułapki. Wtedy mogą być oznaczone do gatunku i policzone. Dyspenser feromonowy SP – Lokator nie zawiera insektycydu. Jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska. Wabi tylko samce mklików i omacnicy spichrzanki.

Sposób działania na owady:

Samice mklika mącznego i innych mklików, a także samice omacnicy spichrzanki żyją tylko 3-5 dni i w tym czasie nie pobierają pokarmu. Aby samica mogła w tak krótkim okresie czasu złożyć jaja, musi jak najszybciej zwabić samca i musi nastąpić kopulacja. W tym celu samice wydzielają feromony płciowe, lotne substancje, na które reagują samce, nawet ze znacznej odległości. Kierują się one do źródła zapachu i w ten sposób lokalizują samicę. Feromonowa pułapka na mkliki SP – Lokator działa na samce podobnie. Dyspenser feromonowy uwalnia feromon płciowy do pomieszczenia, na który reagują samce mklików i omacnicy spichrzanki. Lecą one wtedy do źródła zapachu (dyspensera) i przyklejają się do lepnej podstawy pułapki. Feromonowa pułapka nie tylko lokalizuje ale także wyłapuje samce mklika i omacnicy spichrzanki. W ten sposób zmniejsza się rozrodczość owadów, co prowadzi do zmniejszenia populacji.

Sposób stosowania:

Przygotowanie feromonowej pułapki na mkliki SP – Lokator : W tym celu należy (1) oderwać papier ochronny od lepkiego kartonu zgodnie z wskazanym kierunkiem strzałek; (2) wyjąć dyspenser feromonowy z saszetki i umieścić go na środku powierzchni lepnej pułapki; (3) uformować pułapkę wkładając patkę „A" w szczelinę „B". Ponumerować tak przygotowane pułapki, nanieść datę i rozmieścić je w pomieszczeniu, szczególnie w tych miejscach, które są początkami głównych prądów powietrznych, aby umożliwić rozprzestrzenianie się feromonów po całym pomieszczeniu. Nie należy umieszczać pułapek przy ścianach lub w tych miejscach, w których zawirowania powietrza mogą przyczynić się do wyznaczania samcom mklików mylnego szlaku wabienia. Nie umieszczać pułapek obok otwartych, okien lub przewodów wentylacyjnych, gdzie ruch powietrza przenosiłby feromon poza monitorowany obszar i budynek. Sporządzić plany rozmieszczenia feromonowych pułapek na mkliki SP – Lokator dla każdego pomieszczenia. Feromonowe pułapki na mkliki SP – Lokator należy sprawdzać co najmniej raz na tydzień, zapisywać wyniki kontroli (gatunek motyli, liczba osobników), po czym określić stopień i źródło infestacji pomieszczenia. Feromonowe pułapki na mkliki SP – Lokator należy wymieniać co 6 tygodni lub wtedy, gdy powierzchnia lepna jest zapełniona owadami.

Przechowywanie:

Dyspensery feromonowe SP – Lokator należy przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych i chłodnych miejscach. Temperatura przechowywania nie powinna przekraczać 15^0 C. W takich warunkach dyspensery zachowują swoją aktywność i zdolność wabienia samców mklików i omacnicy spichrzanki przez co najmniej 12 miesięcy. Dyspensery feromonowe można przechowywać w lodówce lub zamrażarce. Schłodzenie dyspenserów do temperatury 4^0 C i niższej wydłuża ich aktywność do 18 miesięcy. Nie należy przechowywać dyspenserów przez okres dłuższy niż 18 miesięcy, nawet w warunkach schłodzenia. Zużyte feromonowe pułapki na mkliki SP – Lokator wraz z dyspenserami wyrzucić do pojemnika na śmieci i traktować jako odpady komunalne. Puste opakowania kartonowe po pułapkach traktować jako surowce wtórne (makulatura). Pojedynczy zestaw feromonowej pułapki na mkliki SP – Lokator składa się z jednej kartonowej pułapki i jednego dyspensera feromonowego. Zbiorcze opakowanie zawiera 20 zestawów.

Środki ostrożności:

Po rozłożeniu pułapek umyć ręce wodą i mydłem. Nie dopuścić dzieci do kontaktu z pułapką. Po kontakcie ze skórą usunąć klej odpowiednim preparatem do czyszczenia i zmyć powierzchnię skóry obficie wodą i mydłem.

Importer i dystrybutor
DEZ-DER P.P.H.U. Eksport - Import,
05-530 Góra Kalwaria , ul. Adamowicza 1
tel / fax : 22 / 717-9000
www.dezder.com.pl

Producent : AgriSense BCS Treforest Industrial Estate, Pontypridd, Wielka Brytania

Okres przydatności 12 mies. w 15^0 C
18 mies. w 4^0 C

Data produkcji: